



Cornell/ CSDD

Dato

@@CurrentDateROTW

***Velg kartlegging**

- Baseline/inkludsjon
- 8 uker
- 12 uker

***Pasient nr**

***Sykehjem nr**

***Afdeling nr**

Enhet nr

Cornell/ CSDD

A. Stemningssymptomer

Skåringen baseres på symptomer og tegn som har vært til stede siste uke før evalueringen.

Det skal ikke skåres hvis symptomene skyldes kroppslige funksjonshemming eller sykdom.

***1. Angst, engstelig uttrykk, grubling, bekymring**

- Lar seg ikke evaluere 9
- Ikke til stede 0
- Moderat eller bare periodevis til stede 1
- Mye til stede 2

***2. Tristhet, trist uttrykk, trist stemme, tar til tårene**

- Lar seg ikke evaluere 9
- Ikke til stede 0
- Moderat eller bare periodevis til stede 1
- Mye til stede 2

***3. Manglende evne til å glede seg over hyggelige hendelser**

- Lar seg ikke evaluere 9
- Ikke til stede 0
- Moderat eller bare periodevis til stede 1
- Mye til stede 2

***4. Irritabilitet, lett irritert**

- Lar seg ikke evaluere 9
- Ikke til stede 0
- Moderat eller bare periodevis til stede 1

Mye til stede 2

TID - TVERRFAGLIG INTERVENSJONSMODELL VED UTFORDRENDE ATFERD VED DEMENS
Skjemaet er produsert og tilrettelagt av Sykehuset Innlandet HF / Alderspsykiatrisk Forskningscenter.

Cornell/ CSDD

B. Forstyrret atferd.

***5. Agitert, rastløs, vrir hendene, river seg i håret**

- Lar seg ikke evaluere 9
- Ikke til stede 0
- Moderat eller bare periodevis til stede 1
- Mye til stede 2

***6. Retardasjon, langsomme bevegelser, langsom tale, reagerer sent**

- Lar seg ikke evaluere 9
- Ikke til stede 0
- Moderat eller bare periodevis til stede 1
- Mye til stede 2

***7. Uttalte kroppslige plager (skår "ikke tilstede" hvis bare mage/tarmsymptomer)**

- Lar seg ikke evaluere 9
- Ikke til stede 0
- Moderat eller bare periodevis til stede 1
- Mye til stede 2

***8. Tap av interesse, mindre opptatt av vanlige aktiviteter (skår "ikke til stede" dersom endringen ikke har skjedd raskt, dvs. i løpet av en måned)**

- Lar seg ikke evaluere 9
- Ikke til stede 0
- Moderat eller bare periodevis til stede 1
- Mye til stede 2

TID - TVERRFAGLIG INTERVENSJONSMODELL VED UTFORDRENDE ATFERD VED DEMENS
Skjemaet er produsert og tilrettelagt av Sykehuset Innlandet HF / Alderspsykiatrisk Forskningscenter.

Cornell/ CSDD

C. Kroppslige tegn

***9. Redusert appetitt, spiser mindre enn ellers**

- Lar seg ikke evaluere 9
- Ikke til stede 0
- Moderat eller bare periodevis til stede 1
- Mye til stede 2

***10. Vekttap (skår "mye tilstede" hvis mer enn 2 kg. i løpet av en måned)**

- Lar seg ikke evaluere 9
- Ikke til stede 0
- Moderat eller bare periodevis til stede 1
- Mye til stede 2

***11. Tap av energi, blir fort trett, klarer ikke å holde ut aktiviteter (skår "ikke til stede" dersom endringen ikke har skjedd raskt, dvs. i løpet av en måned)**

- Lar seg ikke evaluere 9
- Ikke til stede 0
- Moderat eller bare periodevis til stede 1
- Mye til stede 2

Cornell/ CSDD

D. Døgnvariasjoner

***12. Døgnvariasjoner i humøret, humøret verst om morgenen**

- Lar seg ikke evaluere 9
- Ikke til stede 0
- Moderat eller bare periodevis til stede 1
- Mye til stede 2

***13. Innsøvningsvansker, sovner senere enn det som er vanlig for pasienten**

- Lar seg ikke evaluere 9
- Ikke til stede 0
- Moderat eller bare periodevis til stede 1
- Mye til stede 2

***14. Hyppige oppvåkninger i løpet av natten**

- Lar seg ikke evaluere 9
- Ikke til stede 0
- Moderat eller bare periodevis til stede 1
- Mye til stede 2

***15. Tidlig morgenoppvåkning, tidligere enn vanlig for denne pasienten**

- Lar seg ikke evaluere 9
- Ikke til stede 0
- Moderat eller bare periodevis til stede 1
- Mye til stede 2

TID - TVERRFAGLIG INTERVENSJONSMODELL VED UTFORDRENDE ATFERD VED DEMENS
Skjemaet er produsert og tilrettelagt av Sykehuset Innlandet HF / Alderspsykiatrisk Forskningscenter.

Cornell/ CSDD

E. Tankeforstyrrelse

***16. Selvmord, føler livet ikke er verdt å leve, har selvmordstanker, gjør selvmordsforsøk**

- Lar seg ikke evaluere 9
- Ikke til stede 0
- Moderat eller bare periodevis til stede 1
- Mye til stede 2

***17. Dårlig selvbilde, selvbebreidelser, selvedvurderinger, skyldfølelse**

- Lar seg ikke evaluere 9
- Ikke til stede 0
- Moderat eller bare periodevis til stede 1
- Mye til stede 2

***18. Pessimisme, ser svart på framtiden**

- Lar seg ikke evaluere 9
- Ikke til stede 0
- Moderat eller bare periodevis til stede 1
- Mye til stede 2

19. Stemningskongruente vrangforestillinger, forestillinger om fattigdom, sykdom eller tap

- Lar seg ikke evaluere 9
- Ikke til stede 0
- Moderat eller bare periodevis til stede 1
- Mye til stede 2

TID - TVERRFAGLIG INTERVENSJONSMODELL VED UTFORDRENDE ATFERD VED DEMENS
Skjemaet er produsert og tilrettelagt av Sykehuset Innlandet HF / Alderspsykiatrisk Forskningscenter.

Cornell/ CSDD

0

Kartlegging: @@013069 av pasient: @@013070 utført den: @@CurrentDateROTW

Lar seg ikke evaluere = 9, Ikke tilstede = 0, Moderat eller bare delvis til stede = 1, Mye til stede = 2.

STEMNINGSSYMPTOMER:

1. Angst, engstelig uttrykk, grubling, bekymring: @@013072
2. Tristhet, trist uttrykk, trist stemme, tar til tårene: @@013073
3. Manglende evne til å glede seg over hyggelige hendelser: @@013074
4. Irritabilitet, lett irritert: @@013075

FORSTYRRET ATFERD:

5. Agitert, rastløs, vrir hendene, river seg i håret: @@013077
6. Retardasjon, langsomme bevegelser, langsom tale, reagerer sent: @@013078
7. Uttalte kroppslige plager (skår "ikke tilstede" hvis bare mage/tarmsymptomer): @@013079
8. Tap av interesse, mindre opptatt av vanlige aktiviteter (skår bare hvis forandringen har skjedd raskt, dvs. i løpet av en måned): @@013080

KROPPSLIGE TEGN:

9. Redusert appetitt, spiser mindre enn ellers: @@013082
10. Vekttap (skår "mye tilstede" hvis større enn 2 kg. i løpet av en måned): @@013083
11. Tap av energi, blir fort trett, klarer ikke å holde ut aktiviteter (skåres bare hvis forandringen har oppstått raskt, dvs. i løpet av en måned): @@013084

DØGNVARIASJON:

12. Døgnvariasjoner i humøret, humøret verst om morgenen: @@013086
13. Innsøvningsvansker, sovner senere enn det som er vanlig for pasienten: @@013087

14. Hyppige oppvåkninger i løpet av natten: **@@013088**

15. Tidlig morgenoppvåkning, tidligere enn vanlig for denne pasienten: **@@013089**

TANKEFORSTYRRELSE:

16. Selvmord, føler livet ikke er verdt å leve, har selvmordstanker, gjør selvmordsforsøk: **@@013091**

17. Dårlig selvbilde, selvbebreidelser, selvnedvurderinger, skyldfølelse: **@@013092**

18. Pessimisme, ser svart på framtiden: **@@013093**

19. Stemningskongruente vrangforestillinger, forestillinger om fattigdom, sykdom eller tap: **@@013094**

Dersom du skal endre noe på dette skjemaet før du sender det til databasen så må du trykke på knappen "lagre og lukk".

Du kan da gå inn på skjemaet på nytt å gjøre endringer.



Cornell/ CSDD

Skjemaet er nå sendt til databasen

TID - TVERRFAGLIG INTERVENSJONSMODELL VED UTFORDRENDE ATFERD VED DEMENS
Skjemaet er produsert og tilrettelagt av Sykehuset Innlandet HF / Alderspsykiatrisk Forskningscenter.